

レジメンcode:	C43-01
適応がん種:	皮膚がん
レジメン名:	DTIC
間隔:	4~6週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DTIC	ダカルバジン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)[*]	d1

day1

- |            |       |      |                   |              |  |
|------------|-------|------|-------------------|--------------|--|
| 1) プロイメンド  | 150mg | 1    | V                 |              |  |
| 生食         | 100ml | 1    | 本                 |              |  |
|            | 主管①   | 点滴   | 30分               |              |  |
| 2) グラニセトロン | 3mg   | 1    | A                 |              |  |
| デキサート      | 6.6mg | 1    | V                 |              |  |
| デキサート      | 3.3mg | 1    | A                 |              |  |
| 生食         | 50ml  | 1    | 本                 |              |  |
|            | 主管②   | 点滴   | 15分               |              |  |
| 3) ダカルバジン  |       | 1000 | mg/m <sup>2</sup> |              |  |
| 生食         | 500ml | 1    | 本                 |              |  |
|            | 主管③   | 点滴   | 2時間               | 点滴経路全体を遮光[*] |  |
| 4) 生食      | 50ml  | 1    | 本                 |              |  |

フラッシュ

〈所要時間 約3時間30分〉