

レジメンcode:	C49-03
適応がん種:	肉腫
レジメン名:	IFM+ADM
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	20	mg/m ²	点滴(10分)	d1~3
IFM	イホマイド	1500	mg/m ²	点滴(30分)	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

*IFM

- ①ポリカーボネート製三方活栓不可
- ②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内

day1

1) メイロン	20ml	1 A		
生食	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	2時間	
2) プロイメンド	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		【ケモセーフ使用】
	▶側管①	点滴	30分	主管①の60分後から
3) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15 分	側管①に続いて
4) ドキシソルビシン(アドリアシン)		20 mg/m ²		
生食	50ml	1 本		
	▶側管③	点滴	10分	側管②に続いて
5) イホマイド		1500 mg/m ²		
生食	100ml	1 本		
	▶側管④	点滴	30分	側管③に続いて
6) ウロミテキサン	400mg	1 A		
	▶側管	静注	1日3回	
	IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後			

次ページあり

7) メイロン	20ml	1 A
ソリタ-T3	500ml	1 本
	主管②~⑤ 点滴	それぞれ2時間で

8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約10時間30分〉

day2、3

1) メイロン	20ml	1 A
ソリタ-T3	500ml	1 袋
	主管① 点滴	2時間

2) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
デキサート	3.3mg	1 A
生食	50ml	1 本
	▶側管① 点滴	15 分 【ケモセーフ使用】

3) ドキソルビシン(アドリアシン)		20 mg/m ²
生食	50ml	1 本
	▶側管② 点滴	10分 側管①に続いて

4) イホマイド		1500 mg/m ²
生食	100ml	1 本
	▶側管③ 点滴	30分 側管②に続いて

5) ウロミテキサン	400mg	1 A
	▶側管 静注	1日3回
		IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後

6) メイロン	20ml	1 A
ソリタ-T3	500ml	1 本
	主管②~⑤ 点滴	それぞれ2時間で

7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約10時間30分〉

次ページあり

day4、5

1) メイロン	20ml	1 A	
ソリタ-T3	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
2) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
3) イホマイド		1500 mg/m ²	
生食	100ml	1 本	
	▶側管②	点滴	30分 側管①に続いて
4) ウロミテキサン	400mg	1 A	
	▶側管	静注	1日3回
	IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後		
5) メイロン	20ml	1 A	
ソリタ-T3	500ml	1 本	
	主管②~⑤	点滴	それぞれ2時間で
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
	ルートロック		

〈所要時間 約10時間30分〉

day6

1) ソリタ-T3	500ml	1 本	
	主管①	点滴	2時間
2) メイロン	20ml	1 A	
ソリタ-T3	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
3) ソリタ-T3	500ml	1 本	
	主管③	点滴	2時間
4) メイロン	20ml	1 A	
ソリタ-T3	500ml	1 本	
	主管④	点滴	2時間

〈所要時間 約8時間30分〉