

レジメンcode:	C49-04
適応がん種:	肉腫
レジメン名:	GEM+DOC
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	900	mg/m ²	点滴(90分)	d1、8
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	60	mg/m ²	点滴(1時間)	d8

day1

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) ゲムシタビン		900 mg/m ²		
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	90 分	
3) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day8

1) アロキシ	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) ドセタキセル(タキソテル)		60 mg/m ²		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
3) ゲムシタビン		900 mg/m ²		
生食	100ml	1 本		
	主管③	点滴	90 分	
4) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ

〈所要時間 約3時間30分〉

* 予防的G-CSF使用: day9(抗がん剤投与24時間後以降)またはday10から