

レジメンcode:	C49-05
適応がん種:	肉腫
レジメン名:	IFM+PTX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	135	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1
IFM	イホマイド	1600	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1~3

day1

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) ガスター	20mg	1 A			
デキサート	6.6mg	3 V			
ポララミン	5mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管①	点滴	15 分		
3) グラニセトロン	3mg	1 A			
生食	50ml	1 本			
	主管②	点滴	30 分		
4) パクリタキセル(タキソール)		135 mg/m <sup>2</sup>			
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋			
	主管③	点滴	3時間	インラインフィルター必須	
5) メイロン	20ml	1 A			
生食	500ml	1 袋			
	主管④	点滴	2時間		
6) 生食	50ml	1 本			<b>【ケモセーフ使用】</b>
	▶側管①			ルート確保	
7) イホマイド		1600 mg/m <sup>2</sup>			
生食	250ml	1 本			
	▶側管②	点滴	2時間	主管④と同時に	
8) ウロミテキサン		320 mg/m <sup>2</sup>			
	▶側管	静注	1日3回		
				IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後	
9) メイロン	20ml	1 A			
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本			
	主管⑤~⑧	点滴	それぞれ2時間で		
10) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	

〈所要時間 約14時間30分〉

次ページあり

day2、3

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) メイロン	20ml	1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15分 【ケモセーフ使用】
4) イホマイド		1600 mg/m <sup>2</sup>	
生食	250ml	1 本	
	▶側管②	点滴	2時間 側管①に続いて
5) ウロミテキサン		320 mg/m <sup>2</sup>	
	▶側管	静注	1日3回
			IFM投与直前、投与4時間後、投与8時間後
6) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管②~⑤	点滴	それぞれ2時間で
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック
			〈所要時間 約10時間30分〉

day4

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管①	点滴	2時間
3) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
4) ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管③	点滴	2時間
5) メイロン	20ml	1 A	
ソルデム3A(ソリタ-T3)	500ml	1 本	
	主管④	点滴	2時間
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック
			〈所要時間 約8時間30分〉

\*IFM

①ポリカーボネート製三方活栓不可

②室温で6時間以内、冷所保存で24時間以内