

| | |
|-----------|------------|
| レジメンcode: | C49-09 |
| 適応がん種: | 悪性軟部肉腫 |
| レジメン名: | Eribulin療法 |
| 間隔: | 3週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|----|-------------|-----|-------------------|--------|------|
| | ハラヴェン | 1.4 | mg/m ² | 点滴(全開) | d1、8 |

day1、8

| | | | | | |
|--------------|-------|-----------------------|------|--------|--|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | | | |
| | | | | ポート確認 | |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 | | |
| 3) ハラヴェン | | 1.4 mg/m ² | | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | 主管② | 点滴 | 全開 | | |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | | | |
| | | | | フラッシュ | |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | | |
| | | | | ルートロック | |

〈所要時間 約1時間〉

- * DLT: 好中球減少症および発熱性好中球減少症。減量を行う際、下記の用量を参考にすること。
- * QT間隔延長があらわれたとの報告があるので、投与開始前は心電図検査及び電解質検査を行うこと
- * 5%ブドウ糖希釈不可。生理食塩水を用いて希釈すること。0.01mg/ml未満の濃度に希釈しないこと。
- * 1バイアル(1mg/2ml)中に5%無水エタノールを0.1ml含有。

| |
|---|
| 減量前の投与量 → 減量後の投与量 |
| 1.4mg/m ² → 1.1mg/m ² |
| 1.1mg/m ² → 0.7mg/m ² |
| 0.7mg/m ² → 投与中止を考慮 |