

レジメンcode:	C62-02	備考
適応がん種:	胚細胞腫瘍	
レジメン名:	EP	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	20	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~5
VP-16	エトポシド(ベプシド)	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~5

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

★アプレピタント(イメド[®])内服、5日間

day1

アプレピタント(イメド [®])	125 mg	抗がん剤の投与 1時間~1時間30分前
	内服	

day2~5

1) アプレピタント(イメド [®])	80 mg	
	内服	朝食後

day1

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
3) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
4) グラニセトロン	3mg	1 A	抗がん剤の投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド [®])125mg内服
デキサート	6.6mg	1 V	
デキサート	3.3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	
5) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間

次ページあり

6) シスプラチン(フリプラチン)		20 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	2時間
7) マンニトール	300ml	1 V	
	主管⑥	点滴	1時間
8) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管⑦	点滴	2時間
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
ルートロック			
〈所要時間 11時間30分〉			

day2~5

1) 生食	20ml	1 A	
ポート確認			
2) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	2時間
3) 生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	2時間
4) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	15 分
5) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間
6) シスプラチン(フリプラチン)		20 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管⑤	点滴	2時間
7) マンニトール	300ml	1 V	
	主管⑥	点滴	1時間
8) ラクテック	500ml	1 袋	
	主管⑦	点滴	2時間
9) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
ルートロック			
〈所要時間 11時間30分〉			