

レジメンcode:	C71-01
適応がん種:	脳腫瘍(悪性神経膠腫)
レジメン名:	Bev
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
Bv	アバスタチン	10	mg/kg	点滴[*1]	d1
	テモダール	75	mg/m <sup>2</sup>	経口[*2]	連日
	テモダール	150~200	mg/m <sup>2</sup>	経口[*3]	d1~5

\*放射線併用期・維持療法期の投与方法

day1

1) 生食	50ml	1本			
ルート確保					
2) アバスタチン		10 mg/kg			
生食	100ml	1本			
	主管①	点滴	初回90分		
			2回目60分		
			3回目以降30分[*1]		
3) 生食	50ml	1本			
フラッシュ					
				〈所要時間	約1時間30分〉
				〈2回目	約2時間〉
				〈初回	約2時間30分〉

[\*2] 放射線併用期:6週間RT 2Gyを週5回 総線量60Gy

連日

1) テモダール	75 mg/m <sup>2</sup>			
	内服	1日1回空腹時		

[\*3] 維持療法期(1サイクル:28日) 6サイクル

day1~5

1) テモダール	150~200 mg/m <sup>2</sup>			
	内服	1日1回空腹時		

\*2クール以降、200mg/m<sup>2</sup>に増量可