

レジメンcode:	C90-01
適応がん種:	多発性骨髄腫
レジメン名:	VAD
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VCR	オンコビン	0.4	mg/body	点滴(24時間)	d1~d4
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	9	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~d4
	デキサート	33	mg/body	点滴(30分)	d1~d4, d9~12 d17~20

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管①	点滴	30分
3) ドキシソルビシン(アドリアシン)		9 mg/m ²	
オンコビン		0.4 mg/body	
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	24時間

〈所要時間 ー〉

day2~4

1) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	側管①	点滴	30分
2) ドキシソルビシン(アドリアシン)		9 mg/m ²	
オンコビン		0.4 mg/body	
生食	500ml	1 袋	
	主管	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day5

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

2) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間〉

day9~12

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認

2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管①	点滴	30分

3) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉

day17~20

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認

2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管①	点滴	30分

3) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉