

レジメンcode:	C91-01
適応がん種:	急性骨髄性白血病
レジメン名:	CAG
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ACR	アクラシノン	14[*1]	mg/m ²	点滴(30分)	d1~4
Ara-C	キロサイド	10	mg/m ²	皮下注(12時間毎)	d1~14
G-CSF	フィルグラスチムまたはノイトロジン			皮下注	d1~14[*2]

★ACR 総投与量 600mg/m²以下

day1~4

- | | | | |
|--------------|-------|----------------------|-------------------------------|
| 1) グラニセトン | 3mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| <hr/> | | | |
| 2) アクラシノン | | 14 mg/m ² | [*1]70歳以上は10mg/m ² |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30分 |
| <hr/> | | | |
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| <hr/> | | | |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |
| <hr/> | | | |
| 5) キロサイド | | 10 mg/m ² | |
| | | 皮下注射 1日2回 | 12時間毎に |

〈所要時間 約1時間30分〉

次ページあり

day5~14

1) キロサイド

10 mg/m²

皮下注射 1日2回 12時間毎に

〈所要時間 ー〉

day1~14

1) フィルグラスチム

200 μg/m²

または

ノイトロジン

5 μg/kg

皮下注射 1日1回

[*2]好中球減少がみられてから投与されることもある。

〈所要時間 ー〉