

レジメンcode:	C16-12
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	3wHER+カペシタビン
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
CAP	カペシタビン(セローダ)	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝

[*]: 下表を参考

day1

- | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | ルート確保 |
| 3) トラスツズマブ(ハーセプチン) | | 初回 | 8mg/kg |
| | | 2回目以降 | 6mg/kg |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管① | 点滴 | 30 分 (初回 90分) |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |

〈所要時間 約2時間〉

day1夕~15朝

カペシタビン(セローダ) [*] mg

- 1) 内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 36㎡未満	1,200mg(4錠)/回 【2,400mg(8錠)/日】
1. 36㎡~1. 66㎡未満	1,500mg(5錠)/回 【3,000mg(10錠)/日】
1. 66㎡~1. 96㎡未満	1,800mg(6錠)/回 【3,600mg(12錠)/日】
1. 96㎡以上	2,100mg(7錠)/回 【4,200mg(14錠)/日】