

レジメンcode:	その他
適応:	関節リウマチ
レジメン名:	レミケード
間隔:	

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	レミケード	3	mg/kg	点滴[*1]	0.2.6週(以降8週毎)

0週

- | | | | |
|----------|-------|---------|-------------------------|
| 1) 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | ルート確保 |
| 2) レミケード | | 3 mg/kg | |
| 生食 | 250ml | 1 本 | 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを使用 |
| | 主管② | 点滴 | [*1] |

〈所要時間 約2時間30分〉

2週、6週

- | | | | |
|--------------|-------|---------|-------------------------|
| 1) 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | ルート確保 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | Infusion Reaction 予防目的 |
| 水溶性プレドニン20mg | | 1 A | レミケード投与前に |
| | 側管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) レミケード | | 3 mg/kg | |
| 生食 | 250ml | 1 本 | 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを使用 |
| | 主管② | 点滴 | [*1] |

〈所要時間 約2時間30分〉

14週(以降8週毎)

- | | | | |
|----------|-------|---------|-------------------------|
| 1) 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | ルート確保 |
| 2) レミケード | | 3 mg/kg | [*3] |
| 生食 | 250ml | 1 本 | 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを使用 |
| | 主管② | 点滴 | [*2] |

〈所要時間 約1時間30分〉

次ページあり

[*1] 1～3回目までの点滴速度(約2時間で点滴を終了させる場合)

経過時間	点滴速度
0分	20ml/時間×15分
15分	40ml/時間×15分
30分	60ml/時間×15分
45分	80ml/時間×15分
60分	150ml/時間×30分
90分	250ml/時間×30分
120分	点滴終了

↓ Infusion Reactionが認められなければ

[*2] 4回目以降の点滴速度(約1時間で点滴を終了させる場合)

経過時間	点滴速度
0～15分	100ml/時
15～60分	250ml/時

[*3] 6週投与以後、効果不十分・効果減弱した場合、投与量増量や投与間隔短縮が可能

8週の間隔での場合	10mg/kg
投与間隔を短縮した場合	6mg/kg

*ただし、最短の投与間隔は4週間とする