

レジメンcode:	C99-13	備考
適応:	関節リウマチ	
レジメン名:	オレンシア	
間隔:		

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ABT	オレンシア	[*1]	mg	点滴(30分)	0、2、4週(以降4週毎)

0、2、4週(以降4週毎)

- | | | | | |
|----------|-------|---------|-----|-------------------------|
| 1) 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | 主管① | 点滴 | | ルート確保 |
| 2) オレンシア | | [*1] mg | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 30分 | 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを使用 |
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | | | | フラッシュ |

〈所要時間 1時間〉

[*1]

体重	投与量
60kg未満	500mg
60kg以上100kg以下	750mg
100kgを超える	1000mg

*シリコーン油を塗布していない専用のディスポーザブルシリンジ(添付品)及び18~21Gの注射針を使用(蛋白凝集が起こり、浮遊物が生じることがある)

*1バイアル当たり10mlの注射用水(生理食塩液も可)で溶解

*本剤投与前に以下の感染症検査が必要

- ・結核 : 十分な問診及び胸部レントゲン検査、インターフェロン γ 遊離試験又はツベルクリン反応検査
- ・B型肝炎: HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体

* 本剤投与中及び投与中止後3ヶ月間は、生ワクチン接種不可