

レジメンcode:	C18-24
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	sLV5-FU2-IF(インフューザー)
間隔:	2週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
I-LV	レボホリナート	200	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	400	mg/m ²	点滴(全開)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	2400	mg/m ²	点滴(46時間)	d1

day1

1) 生食	20ml	1 A			
				ポート確認	
2) グラニセトロン	3mg	1 A			
デキサート	6.6mg	1 V			
生食	50ml	1 本			
	主管①	点滴	15分		
3) レボホリナート		200 mg/m ²			
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋			
	主管②	点滴	2時間		
4) フルオロウラシル(5-FU)		400 mg/m ²			
ブドウ糖液5%	50ml	1 本			
	主管③	点滴	全開		
5) 生食	50ml	1 本			
	主管④			フラッシュ	
6) フルオロウラシル(5-FU)		2400 mg/m ²			
生食	100ml	総液量140ml になるように調製			
	主管⑤	点滴	46時間		
				(インフューザー)	
				〈所要時間	ー〉

day3

1) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒			
				ルートロック	
				〈所要時間	ー〉