

レジメンcode:	C21-01
適応がん種:	肛門癌
レジメン名:	5-FU+MMC+RT
間隔:	8週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
MMC	マイトマイシン	10	mg/m ²	点滴(全開)	d1、29
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	1000	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~4、29~32
RT		1.8	Gy	計 59.4Gy	

day1、29

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) マイトマイシン		10 mg/m ²		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	全開で	
3) フルオロウラシル(5-FU)		1000 mg/m ²		
生食	500ml	1 袋		
	主管③	点滴	24時間	

〈所要時間 ー〉

day2~4、30~32

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15 分	
2) フルオロウラシル(5-FU)		1000 mg/m ²		
生食	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて	

〈所要時間 ー〉

day5、33

生食	50ml	1 本		
			フラッシュ	

〈所要時間 ー〉