

レジメンcode:	C22-01
適応がん種:	胆道癌
レジメン名:	TS-1+GEM
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg/m <sup>2</sup>	内服(朝夕食後)	d1~14
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1、8

day1、8

- |              |       |                        |        |
|--------------|-------|------------------------|--------|
| 1) 生食        | 20ml  | 1 A                    |        |
|              |       |                        | ポート確認  |
| 2) デキサート     | 6.6mg | 1 V                    |        |
| 生食           | 50ml  | 1 本                    |        |
|              | 主管①   | 点滴                     | 15 分   |
| 3) ゲムシタビン    |       | 1000 mg/m <sup>2</sup> |        |
| 生食           | 100ml | 1 本                    |        |
|              | 主管②   | 点滴                     | 30 分   |
| 4) 生食        | 50ml  | 1 本                    |        |
|              |       |                        | フラッシュ  |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml  | 1 筒                    |        |
|              |       |                        | ルートロック |
- 〈所要時間 約2時間〉

day1~14

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 1) ティーエスワン | [*] mg/m <sup>2</sup> |
|            | 内服 朝夕食後               |

[\*]

体表面積	投与量
1. 25m <sup>2</sup> 未満	30mg/回 (60mg/日)
1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 (80mg/日)
1.5m <sup>2</sup> 以上	50mg/回 (100mg/日)