

| | |
|-----------|---------------|
| レジメンcode: | C25-04 |
| 適応がん種: | 膵癌 |
| レジメン名: | GEM+Erlotinib |
| 間隔: | 4週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-----|-------------|------|-------------------|--------------|---------|
| GEM | ゲムシタビン | 1000 | mg/m ² | 点滴(30分) | d1、8、15 |
| | タルセバ | 100 | mg/body | 内服(1日1回)[*1] | d1~28 |

day1、8、15

- | | | | |
|--------------|-------|------------------------|--------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 3) ゲムシタビン | | 1000 mg/m ² | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30 分 |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |
- 〈所要時間 約2時間〉

day1~28

- | | | |
|---------|-------------|----------|
| 1) タルセバ | 100 mg/body | |
| | 内服 | 1日1回[*1] |

[*1]食事の1時間以上前又は食後2時間以降に内服