

レジメンcode:	C15-04
適応がん種:	食道癌
レジメン名:	アクプラ+5-FU
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
NDP	アクプラ	90	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	800	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~5

day1【ケモセーフ使用】

1) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) アクプラ		90 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋		
	主管②	点滴	1時間	
3) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 本		
	主管③	点滴	24時間	

〈所要時間 ー〉

day2~5【ケモセーフ使用】

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15 分	
2) フルオロウラシル(5-FU)		800 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	1000ml	1 本		
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day6

1) 生食	50ml	1 本		
				ルートフラッシュ

〈所要時間 ー〉