

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*]
3) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
主管②	点滴	15 分	
4) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
主管③	点滴	30 分	
5) エンドキサン		1200 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 袋	
主管④	点滴	1時間	
6) エトポシド(ベブシド)		100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
主管⑤	点滴	2時間	
7) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約10時間〉

次ページあり

day2、3【ケモセーフ使用】

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
4) キロサイド		2000 mg/m ²	【ケモセーフ使用】
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	3時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉