

レジメンcode:	C22-10
適応がん種:	胆道癌
レジメン名:	GCS
間隔:	2週間

備考
----

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(ブリアプラチン)	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1
TS-1	ティーエスワン	[*]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d8朝

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1【ケモセーフ使用】

1) 生食	20ml	1 A		
ポート確認				
2) 硫酸Mg補正液		10 ml		
ラクテック	500ml	1 袋		
	主管①	点滴	1時間	
3) パロノセトロン	0.75mg	1 V		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	15 分	
4) シスプラチン(ブリアプラチン)		25 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	250ml	1 本		
	主管③	点滴	1時間	
5) ラクテック	500ml	1 袋		
	主管④	点滴	1時間	
6) ゲムシタビン		1000 mg/m <sup>2</sup>		【ケモセーフ使用】
生食	100ml	1 本		
	主管⑤	点滴	30 分	
7) ラクテック	500ml	1 袋		
	主管⑥	点滴	1時間	
8) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
ルートロック				

〈所要時間 約5時間30分〉

day1夕~day8朝

1) ティーエスワン	[*] mg		
	内服	朝夕食後	

[\*]

体表面積	投与量
1. 25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25~1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回 【120mg/日】