

レジメンcode:	C16-30
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	HER+SOX
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	8	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	6	mg/kg	点滴(30分)	d1
L-OHP	オキサリプラチン(エルプラット)	100[*1]	mg/m ²	点滴(2時間)	d1
S-1	エスワン	[*2]	mg	内服(朝夕食後)	d1夕~d15朝

[*1]患者状態を考慮して、臨床試験の用量130mg/m²での投与可能。

[*2]: 下表を参考

day1【ケモセーフ使用】

- | | | | |
|---------------------|--------|---------------------------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | ルート確保 |
| 3) トラスツズマブ(ハーセプチン) | | 初回 8mg/kg | |
| | | 2回目以降 6mg/kg | |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管① | 点滴 | 30 分 (初回 90分) |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 15 分 |
| 5) パロノセトロン | 0.75mg | 1 V | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 15分 |
| 6) オキサリプラチン(エルプラット) | | 100[*1] mg/m ² | 【ケモセーフ使用】 |
| ブドウ糖液5% | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 |
| 7) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 8) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |

〈初回 約4時間30分〉

〈所要時間 約3時間30分〉

day1夕～day15朝

1) エスワン

[*] mg

内服 朝夕食後

[*]

体表面積	投与量
1. 25m ² 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25～1.5m ² 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m ² 以上	60mg/回 【120mg/日】