

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| レジメンcode: | C85-43          |
| 適応がん種:    | 悪性リンパ腫(中枢神経系原発) |
| レジメン名:    | R-MPV           |
| 間隔:       | 2週間             |

|    |
|----|
| 備考 |
|    |

| 略名  | 抗がん剤(採用薬品名)   | 投与量     | 単位                | 投与法     | 投与日       |
|-----|---------------|---------|-------------------|---------|-----------|
|     | リツキシマブ(リツキサン) | 375     | mg/m <sup>2</sup> | 点滴[*1]  | d1        |
| VCR | オンコビン         | 1.4[*2] | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(全開)  | d2        |
| MTX | メソトレキセート[*2]  | 3500    | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(3時間) | d2        |
|     | プロカルバジン       | 100     | mg/m <sup>2</sup> | 内服(朝食後) | d1~d7[*4] |

[\*3]day1~5

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1) ダイアモックス | 250~500 mg/日 |
|            | 内服 朝夕食後      |

\*尿を経時的にチェックしpH7.0以上に維持すること。□

\*ダイアモックスは利尿及び尿のアルカリ化作用を有するので、ダイアモックス250~500mg/日をメソトレキセート投与前日からロイコボリンの救援投与終了まで経口又は静脈内投与すること。

\*尿を酸性化する利尿剤(例えば、フロセミド、チアジド系利尿剤等)の使用を避けること

\*メソトレキセートの血中濃度を経時的に測定すること。

メソトレキセートの血中濃度の危険限界は24時間値で $1 \times 10^{-5}$ モル濃度、48時間値で $1 \times 10^{-6}$ モル濃度、72時間値で $1 \times 10^{-7}$ モル濃度であるので危険限界以上の濃度の際はロイコボリンの増量投与・ロイコボリン救援投与の延長等の処置を行うこと。

[\*4]day1~7

- |            |                       |
|------------|-----------------------|
| 1) プロカルバジン | 100 mg/m <sup>2</sup> |
|            | 内服 朝食後                |

\*奇数クールのみ内服

day1

- |             |       |              |
|-------------|-------|--------------|
| 1) カロナール    | 200mg | 2 錠          |
| d-クロルフェニラミン |       | 1 錠          |
|             | 内服    | リツキシマブ投与30分前 |

次ページあり

day1【ケモセーフ使用】

|                  |       |                       |   |  |
|------------------|-------|-----------------------|---|--|
| 1) 生食            | 50ml  | 1 本                   | 内服前投薬、心電図確認<br>ルート確保  |  |
| 2) リツキシマブ(リツキサン) |       | 375 mg/m <sup>2</sup> |   |  |
| 生食               | 500ml |                       | 生食で10倍に希釈   |  |
| 主管①              | 点滴    |                       | 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr<br>と1時間ごとに投与速度を上げる<br>2回目以降は100ml/hrから開始[*1] |  |
| 3) 生食            | 50ml  | 1 本                   |   |  |
| 主管②              |       |                       | フラッシュ   |  |
| 4) ソルデム3A        | 500ml | 1 本                   |   |  |
| メイロン             | 20ml  | 1 A                   |   |  |
| 主管③              | 点滴    |                       | 50ml/h翌日2:00まで投与、残破棄  |  |

〈所要時間 ー〉

day2【ケモセーフ使用】

|             |        |                        |           |         |
|-------------|--------|------------------------|-----------|---------|
| 1) ソルデム3A   | 500ml  | 1 本                    |           |         |
| メイロン        | 20ml   | 1 A                    |           |         |
| 主管①         | 点滴     |                        | 8時間       | (2:00)  |
| 2) ソルデム3A   | 500ml  | 1 本                    |           |         |
| メイロン        | 20ml   | 1 A                    |           |         |
| 主管②         | 点滴     |                        | 8時間       | (10:00) |
| 3) プロイメンド   | 150mg  | 1 V                    |           |         |
| 生食          | 100ml  | 1 本                    |           |         |
| ▶側管①        | 点滴     |                        | 30分       | (10:00) |
| 4) パロノセトロン  | 0.75mg | 1 V                    |           |         |
| デキサート       | 6.6mg  | 1 V                    |           |         |
| デキサート       | 3.3mg  | 1 A                    |           |         |
| 生食          | 50ml   | 1 本                    |           |         |
| ▶側管②        | 点滴     |                        | 15分       | (10:30) |
| 5) オンコピン    |        | 1.4 mg/m <sup>2</sup>  | 最大2mg[*2] |         |
| 生食          | 50ml   | 1 本                    | 【ケモセーフ使用】 |         |
| ▶側管③        | 点滴     | 全開                     | (10:45)   |         |
| 6) メソトレキセート |        | 3500 mg/m <sup>2</sup> | 【ケモセーフ使用】 |         |
| 生食          | 500ml  | 全量500mlになるように生食を調製     |           |         |
| ▶側管④        | 点滴     | 3時間                    | (11:00)   |         |

|           |       |     |     |         |
|-----------|-------|-----|-----|---------|
| 7) 生食     | 50ml  | 1 本 |     |         |
|           | ▶側管⑤  |     |     | フラッシュ   |
| 8) ソルデム3A | 500ml | 1 本 |     |         |
| メイロン      | 20ml  | 1 A |     |         |
|           | 主管③   | 点滴  | 8時間 | (18:00) |

〈所要時間 ー〉

day3

|           |       |     |     |         |
|-----------|-------|-----|-----|---------|
| 1) ソルデム3A | 500ml | 1 本 |     |         |
| メイロン      | 20ml  | 1 A |     |         |
|           | 主管①   | 点滴  | 8時間 | (2:00)  |
| 2) ソルデム3A | 500ml | 1 本 |     |         |
| メイロン      | 20ml  | 1 A |     |         |
|           | 主管②   | 点滴  | 8時間 | (10:00) |
| 3) ロイコボリン | 3mg   | 5 A |     |         |
| 生食        | 50ml  | 1 本 |     |         |
|           | ▶側管①  | 点滴  | 15分 | (11:00) |
| 4) ロイコボリン | 3mg   | 5 A |     |         |
| 生食        | 50ml  | 1 本 |     |         |
|           | ▶側管②  | 点滴  | 15分 | (17:00) |
| 5) ソルデム3A | 500ml | 1 本 |     |         |
| メイロン      | 20ml  | 1 A |     |         |
|           | 主管③   | 点滴  | 8時間 | (18:00) |
| 6) ロイコボリン | 3mg   | 5 A |     |         |
| 生食        | 50ml  | 1 本 |     |         |
|           | ▶側管③  | 点滴  | 15分 | (23:00) |

〈所要時間 ー〉

day4

|           |       |     |     |        |
|-----------|-------|-----|-----|--------|
| 1) ソルデム3A | 500ml | 1 本 |     |        |
| メイロン      | 20ml  | 1 A |     |        |
|           | 主管①   | 点滴  | 8時間 | (2:00) |
| 2) ロイコボリン | 3mg   | 5 A |     |        |
| 生食        | 50ml  | 1 本 |     |        |
|           | ▶側管①  | 点滴  | 15分 | (5:00) |

次ページあり

|           |       |    |     |         |  |
|-----------|-------|----|-----|---------|--|
| 3) ソルデム3A | 500ml |    | 1 本 |         |  |
| メイロン      | 20ml  |    | 1 A |         |  |
|           | 主管②   | 点滴 | 8時間 | (10:00) |  |
| 4) ロイコボリン | 3mg   |    | 5 A |         |  |
| 生食        | 50ml  |    | 1 本 |         |  |
|           | ▶側管②  | 点滴 | 15分 | (11:00) |  |
| 5) ロイコボリン | 3mg   |    | 5 A |         |  |
| 生食        | 50ml  |    | 1 本 |         |  |
|           | ▶側管③  | 点滴 | 15分 | (17:00) |  |
| 6) ソルデム3A | 500ml |    | 1 本 |         |  |
| メイロン      | 20ml  |    | 1 A |         |  |
|           | 主管③   | 点滴 | 8時間 | (18:00) |  |
| 7) ロイコボリン | 3mg   |    | 5 A |         |  |
| 生食        | 50ml  |    | 1 本 |         |  |
|           | ▶側管④  | 点滴 | 15分 | (23:00) |  |

〈所要時間 ー〉

day5

|           |       |    |     |        |  |
|-----------|-------|----|-----|--------|--|
| 1) ソルデム3A | 500ml |    | 1 本 |        |  |
| メイロン      | 20ml  |    | 1 A |        |  |
|           | 主管①   | 点滴 | 8時間 | (2:00) |  |
| 2) ロイコボリン | 3mg   |    | 5 A |        |  |
| 生食        | 50ml  |    | 1 本 |        |  |
|           | ▶側管①  | 点滴 | 15分 | (5:00) |  |

〈所要時間 ー〉