

レジメンcode:	C43-05	備考
適応がん種:	悪性黒色腫	
レジメン名:	Nivolumab+Ipilimumab	
間隔:	3週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	オプジーボ	80	mg/body	点滴(30分)	d1
	ヤーボイ	3	mg/kg	点滴(90分)	d1

day1

1) 生食	50ml	1本			
ルート確保					
2) オプジーボ		80 mg/body			
生食	100ml	1本			
(フィルター必須)					
	主管①	点滴	30分		
3) 生食	50ml	1本			
	主管②	点滴	30分		
4) ヤーボイ		3 mg/kg			
生食	30ml	1本			
(フィルター必須)					
	主管③	点滴	90分		
5) 生食	50ml	1本			
フラッシュ用					
〈所要時間 約3時間〉					

*5コース目以降は、C43-02Nivolumab(2週間間隔)又はC43-04Nivolumab(4週間間隔)へレジメン変更。

*インラインフィルター(0.2又は0.22 μ m)を使用する。

*希釈後の最終濃度0.35mg/ml未満(オプジーボ)では、点滴中の安定性が確認されていない。

*ヤーボイは1~4mg/mlの濃度に希釈して投与する。

*他剤との混合注射はしない。