

レジメンcode:	C03-11
適応がん種:	頭頸部癌
レジメン名:	PTX+Cet
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
PTX	パクリタキセル(タキソール)	80	mg/m ²	点滴(1時間)	d1.8.15
Cet	アービタックス(初回)	400	mg/m ²	点滴(2時間)	
	(2回目以降)	250	mg/m ²	点滴(1時間)	d1.8.15.22

day1.8.15

1) 生食	20ml	1 A		
				ポート確認
2) ガスター	20mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
ポララミン	5mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
3) 生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
4) パクリタキセル(タキソール)		80 mg/m ²		
ブドウ糖液5%	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	インラインフィルター必須
5) アービタックス	初回	400 mg/m ²		
	2回目以降	250 mg/m ²		
生食	250ml	1 袋		
	主管④	点滴	初回2時間	
			2回目以降1時間	
6) 生食	50ml	1 本		
	主管⑤	点滴	1時間	経過観察(2回目以降は15分で)
7) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		

ルートロック

〈所要時間 約3時間30分〉

(初回 約5時間)

次ページあり

day22

1) 生食	20ml	1 A	
			ポート確認
2) デキサート	6.6mg	1 V	
ポララミン	5mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
3) アービタックス		250 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管②	点滴	1時間
4) 生食	50ml	1 本	
	主管③	点滴	15分
5) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約2時間〉