

| | |
|-----------|--------|
| レジメンcode: | C49-01 |
| 適応がん種: | 肉腫 |
| レジメン名: | IFM |
| 間隔: | 3週間 |

| |
|----|
| 備考 |
| |

| 略名 | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量 | 単位 | 投与法 | 投与日 |
|-----|-------------|------|-------------------|----------|------|
| IFM | イホマイド | 3000 | mg/m ² | 点滴(24時間) | d1~3 |

day1

| | | | | | |
|------------|--------|------|-------------------|--|--|
| 1) メイロン | 20ml | 2 | A | | |
| 生食 | 1000ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管① | 点滴 | 4時間 | | |
| 2) グラニセロン | 3mg | 1 | A | | |
| デキサート | 6.6mg | 1 | V | | |
| デキサート | 3.3mg | 1 | A | | |
| 生食 | 50ml | 1 | 本 | | |
| | 主管② | 点滴 | 15分 | | |
| 3) ウロミテキサン | 400mg | 1 | A | | |
| | 側管① | 緩徐に | 主管②と同時に | | |
| 4) イホマイド | | 3000 | mg/m ² | | |
| 生食 | 500ml | 1 | 本 | | |
| | 側管② | | 24時間 | | |
| 5) ウロミテキサン | 400mg | 2 | A | | |
| メイロン | 20ml | 2 | A | | |
| 生食 | 1000ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 8時間 | | |
| 6) ウロミテキサン | 400mg | 2 | A | | |
| メイロン | 20ml | 2 | A | | |
| 生食 | 1000ml | 1 | 袋 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 8時間 | | |

〈所要時間 - 〉

次ページあり

day2、3

| | | |
|------------|--------|------------------------|
| 1) ウロミテキサン | 400mg | 2 A |
| メイロン | 20ml | 2 A |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 |
| | 主管① | 点滴 8時間 |
| 2) グラニセトロン | 3mg | 1 A |
| デキサート | 6.6mg | 1 V |
| デキサート | 3.3mg | 1 A |
| 生食 | 50ml | 1 本 |
| | 主管② | 点滴 15 分 |
| 3) ウロミテキサン | 400mg | 2 A |
| メイロン | 20ml | 2 A |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 |
| | 主管③ | 点滴 8時間 |
| 4) ウロミテキサン | 400mg | 2 A |
| メイロン | 20ml | 2 A |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 |
| | 主管④ | 点滴 8時間 |
| 5) イホマイド | | 3000 mg/m ² |
| 生食 | 500ml | 1 本 |
| | 側管② | 24時間 |

〈所要時間 - 〉

day4

| | | |
|------------|--------|--------|
| 1) ウロミテキサン | 400mg | 2 A |
| メイロン | 20ml | 2 A |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 |
| | 主管① | 点滴 8時間 |
| 2) ウロミテキサン | 400mg | 2 A |
| メイロン | 20ml | 2 A |
| 生食 | 1000ml | 1 袋 |
| | 主管② | 点滴 8時間 |

〈所要時間 16時間30分 〉