レジメンcode :	C62-01
適応がん種:	胚細胞腫瘍
レジメン名:	BEP
間隔:	3週間

備考		

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CDDP	シスプラチン(ブリプラチン)	20	mg∕ m ੰ	点滴(2時間)	d1~5
VP-16	エトポシド(ベプシド)	100	mg/ m ²	点滴(2時間)	d1∼5
BLM	ブレオ	30[*]	mg/body	点滴(30分)	d2、9、16

★BLM 総投与量 360mg/body以下

- ★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。
- ★アプレピタント(イメンド)内服、5日間

	day1					_
1)	アプレピタント(イメンド)		内服	125 mg	抗がん剤の投与 1時間~1時間30分前	
	day2~5					
1)	アプレピタント(イメンド)			80 mg		
			内服	朝食後		-
	day1					
1)	生食	20ml		1 A		•
					ポート確認	-
2)	硫酸Mg補正液			1 A		
	生食	500ml		1 袋		
		主管①	点滴	2時間		-
3)	生食	500ml		1 袋		
		主管②	点滴	2時間		_
4)	グラニセトロン	3mg		1 A	抗がん剤の投与1時[問~1時間30分前に
	デキサート	6.6mg		1 V		(イメント [*])125mg内服
	デキサート	3.3mg		1 A		
	生食	50ml		1 本		
		主管③	点滴	15 分		_

					_
5) エトポシド(ベプシド)			100 mg/ m ²		
生食	500ml		1 袋		
	主管④	点滴	2時間		_
6) シスプラチン(ブリプラチン)			$20~\text{mg}/\text{m}^{2}$		
生食	500ml		1 袋		
	主管⑤	点滴	2時間		_
7) マンニットール	300ml		1 V		
	主管⑥	点滴	1時間		_
8) ラクテック	500ml		1 袋		
	主管⑦	点滴	2時間		_
9)へパリンNaロック	10ml		1 筒		
				ルートロック	_
				〈所要時間	11時間30分〉
day2					_
1) 生食	20ml		1 A		
				ポート確認	_
2)硫酸Mg補正液			1 A		
生食	500ml		1 袋		
	主管①	点滴	2時間		_
3) 生食	500ml		1 袋		
	主管②	点滴	2時間		_
4) グラニセトロン	3mg		1 A		
デキサート	6.6mg		1 V		
生食	50ml		1 本		
	主管③	点滴	15 分		_
5) エトポシド(ベプシド)			100 mg/ m ²		
生食	500ml		1 袋		
	主管④	点滴	2時間		_
6) シスプラチン(ブリプラチン)			20 mg/ m ³		
生食	500ml		1 袋		
	主管⑤	点滴	2時間		_
			30 mg/boo	ly [*]体表面積1.4㎡未漏	毒は20mg∕ ㎡

1 本

点滴 30分

50ml

主管⑥

生食

8)	マンニットール	300ml		1	٧			
		主管⑦	点滴		1時間			
9)	ラクテック	500ml		1	袋			
		主管⑧	点滴		2時間			
10)	ヘパリンNaロック	10ml		1	筒			
						ルートロック		
							〈所要時間	12時間30分〉
	day3~5							
1)	生食	20ml		1	Α			
						ポート確認		
2)	硫酸Mg補正液			1	Α			
	生食	500ml		1	袋			
		主管①	点滴		2時間			
3)	生食	500ml		1	袋			
		主管②	点滴		2時間			
4)	グラニセトロン	3mg		1	Α			
	デキサート	6.6mg		1	V			
	生食	50ml		1	本			
		主管③	点滴		15 分			
5)	エトポシド(ベプシド)			100	mg/m^2			
	生食	500ml		1	袋			
		主管④	点滴		2時間			
6)	シスプラチン(ブリプラチン)			20	mg/m^2			
	生食	500ml		1	袋			
		主管⑤	点滴		2時間			
7)	マンニットール	300ml		1	V			
		主管⑥	点滴		1時間			
8)	ラクテック	500ml		1	袋			
		主管⑦	点滴		2時間			
9)	ヘパリンNaロック	10ml		1	筒			
						ルートロック		
								1.4 『土目目ののノ\\

〈所要時間 11時間30分〉

	day9、16						
1)	生食	20ml		1	Α		
						ポート確認	
2)	生食	50ml		1	V		
						ルート確保	
3)	ブレオ			30	mg/body	[*]体表面積1.4㎡未満	は20mg/mឺ
	生食	50ml		1	本		
		主管①	点滴		30分		
4)	生食	50ml		1	本		
						フラッシュ	
5)	ヘパリンNaロック	10ml		1	筒		
						ルートロック	

〈所要時間 約1時間〉