

レジメンcode:	C67-03
適応がん種:	膀胱がん
レジメン名:	GEM+CBDCA
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8、15
CBDCA	カルボプラチン(パラプラチン)	5	AUC	点滴(1時間)	d2

day1、8、15

1) デキサート	6.6mg	1 V		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²		
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
3) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒		
				ルートロック

〈所要時間 約1時間30分〉

day2

1) プロイメンド	150mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	主管①	点滴	30分	
2) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	3.3mg	1.5 A		
生食	50ml	1 本		
	主管②	点滴	15 分	
3) カルボプラチン(パラプラチン)		5 AUC		
生食	250ml	1 袋		
	主管③	点滴	1時間	
4) 生食	50ml	1 本		
				フラッシュ

〈所要時間 約2時間15分〉