

レジメンcode:	C85-22
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-GEOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
VP-16	エトポシド(ベプシド)	50	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d2
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d2~6
VP-16	ベプシド	100	mg/m ²	内服	d3,4

day1

- | | | | |
|-------------|-------|----|--------------|
| 1) カロナール | 200mg | 2錠 | |
| d-クロルフェニラミン | | 1錠 | |
| | 内服 | | リツキシマブ投与30分前 |

day1

- | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|---|
| 1) 生食 | 50ml | 1本 | 内服前投薬、心電図確認
ルート確保 |
| 2) リツキシマブ(リツキサン) | | 375 mg/m ² | |
| 生食 | 500ml | | 生食で10倍に希釈 |
| 主管① | 点滴 | | 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr
と1時間ごとに投与速度を上げる
2回目以降は100ml/hrから開始[*1] |
| 3) 生食 | 50ml | 1本 | フラッシュ |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml | 1筒 | ルートロック |

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分 【ケモセーフ使用】
<hr/>		
2) エンドキサン		750 mg/m ²
生食	250ml	1 袋
	主管②	点滴 1時間
<hr/>		
3) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m ²
生食	250ml	1 本
	主管③	点滴 1時間
<hr/>		
4) オンコビン		1.4 mg/m ² 最大2mg[*2]
生食	50ml	1 本
	主管④	点滴 全開
<hr/>		
5) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ

〈所要時間 約3時間30分〉

day2~6

1) プレドニゾロン		100 mg/body
	内服	朝昼食後

day3.4

1) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²
	内服	朝食後
