

レジメンcode:	C85-23
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	GDP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
GEM	ゲムシタビン	1000	mg/m ²	点滴(30分)	d1、8
	デキサート	33	mg/body	点滴(15分)	d1~4
CDDP	シスプラチン(フリプラチン)	75	mg/m ²	点滴(2時間)	d1

★尿量確保に注意し、必要に応じて利尿剤(フロセミド等)を投与する。

day1

- | | | | | |
|-------------------|-------|------------------------|-----|-------------|
| 1) 硫酸Mg補正液 | 20ml | 1 A | | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管① | 点滴 | 2時間 | |
| 2) 生食 | 500ml | 1 袋 | | |
| | 主管② | 点滴 | 2時間 | |
| 3) プロイメンド | 150mg | 1 V | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | ▶側管① | 点滴 | 30分 | 主管②開始60分後から |
| 4) グラニセトロン | 3mg | 1 A | | |
| デキサート | 6.6mg | 5 V | | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 | 側管①に続いて |
| 5) ゲムシタビン | | 1000 mg/m ² | | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | | |
| | 主管③ | 点滴 | 30分 | |
| 6) シスプラチン(フリプラチン) | | 75 mg/m ² | | |
| 生食 | 500ml | 総液量650ml以下になるように生食を調製 | | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 | |
| 7) マンニトール | 300ml | 1 V | | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 1時間 | |
| 8) ソルラクト | 1L | 1 袋 | | |
| | 主管⑥ | 点滴 | 3時間 | |
| 9) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | | |

ルートロック

次ページあり

〈所要時間 約9時間〉

day2、3

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) 硫酸Mg補正液	20ml	1 A
ラクテック	500ml	1 袋
	主管②	点滴 2時間
3) ラクテック	500ml	1 袋
	主管③	点滴 2時間
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒

ルートロック

〈所要時間 約5時間〉

day4

1) デキサート	6.6mg	5 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分

〈所要時間 15分〉

day8

1) デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分
2) ゲムシタビン		1000 mg/m ²
生食	100ml	1 本
	主管②	点滴 30 分
3) 生食	50ml	1 本

フラッシュ

〈所要時間 約1時間〉