

レジメンcode:	C85-24
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	miniCHOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	400	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	25	mg/m ²	点滴(全開)	d1
VCR	オンコビン	1	mg/body	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	40	mg/m ²	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

- | | | |
|---------------------|-------|--------------------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg | 1 A |
| 生食 | 50ml | 1 本 |
| | 主管① | 点滴 15 分 【ケモセーフ使用】 |
| 2) エンドキサン | | 400 mg/m ² |
| 生食 | 250ml | 1 袋 |
| | 主管② | 点滴 1時間 |
| 3) ドキシソルビシン(アドリアシン) | | 25 mg/m ² |
| 生食 | 50ml | 1 本 |
| | 主管③ | 点滴 全開 |
| 4) オンコビン | | 1 mg/body |
| 生食 | 50ml | 1 本 |
| | 主管④ | 点滴 全開 |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 |

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day1~5

- | | | |
|------------|----|----------------------|
| 1) プレドニゾロン | | 40 mg/m ² |
| | 内服 | 朝昼食後 |