

レジメンcode:	C90-03
適応がん種:	多発性骨髄腫
レジメン名:	BDweekly療法
間隔:	5週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
BOR	ベルケイド	1.3	mg/m <sup>2</sup>	静注	d1、8、15、22

d1、8、15、22

- |          |       |                       |      |                 |
|----------|-------|-----------------------|------|-----------------|
| 1) 生食    | 50ml  | 1 本                   |      |                 |
|          | 主管①   | 点滴                    | 15 分 |                 |
| <hr/>    |       |                       |      |                 |
| 2) ベルケイド |       | 1.3 mg/m <sup>2</sup> |      |                 |
| 生食       | 3ml   |                       |      | 3ml/1V 溶解後必要量調製 |
|          | ▶側管①  | 静注                    |      | 主管①の途中で         |
| <hr/>    |       |                       |      |                 |
| 3) デキサート | 6.6mg | 3 V                   |      |                 |
| 生食       | 100ml | 1 本                   |      |                 |
|          | 主管②   | 点滴                    | 30分  |                 |

〈所要時間 約1時間〉

day2、9、16、23

- |           |     |         |  |
|-----------|-----|---------|--|
| 1) レナデックス | 4mg | 5 錠/day |  |
|           | 内服  | 朝食後     |  |

連日

- |        |       |           |  |
|--------|-------|-----------|--|
| 1) バクタ |       | 1 錠/day   |  |
| アシクロビル | 400mg | 0.5 錠/day |  |
|        | 内服    | 朝食後       |  |

ニューモシスチス肺炎、帯状疱疹の発症予防のため上記薬剤の内服が推奨されている