

レジメンcode:	C91-02
適応がん種:	急性骨髄性白血病
レジメン名:	DNR+Ara-C
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
DNR	ダウノマイシン	50	mg/m ²	点滴(全開)	d1~3
Ara-C	キロサイド	100	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~7

★DNR 総投与量 25mg/kg以下

day1

1) グラニセロン	3mg	1 A	抗がん剤の投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド)125mg内服
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ダウノマイシン		50 mg/m ²	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	全開
3) キロサイド		100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	24時間

〈所要時間 ー〉

day2、3

1) アプレピタント(イメド)	80 mg	
	内服	朝食後

day2~3

1) グラニセロン	3mg	1 A
デキサート	3.3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	▶側管①	点滴 15 分
2) ダウノマイシン		50 mg/m ²
生食	50ml	1 本
	▶側管②	点滴 全開

次ページあり

3) 生食	50ml	1 本	
	▶側管③		フラッシュ

4) キロサイド		100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day4~7

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分

2) キロサイド		100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day8

1) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 ー〉