

レジメンcode:	C91-03
適応がん種:	急性骨髄性白血病
レジメン名:	IDR+Ara-C
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
IDR	イダマイシン	12	mg/m ²	点滴(全開)	d1~3
Ara-C	キロサイド	100	mg/m ²	点滴(24時間)	d1~7

★IDR 総投与量 120mg/m²以下

day1

1) グラニセトロン	3mg	1 A	抗がん剤の投与1時間~1時間30分前に アプレピタント(イメド [®]) 125mg内服
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) イダマイシン		12 mg/m ²	1Vあたり5mlの注射用水で溶解
注射用水	100ml	1 本	
生食	50ml	1 本	
	主管②	点滴	
3) キロサイド		100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	

〈所要時間 ー〉

day2、3

1) アプレピタント(イメド [®])	80 mg	
	内服	朝食後

day2、3

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分
2) イダマイシン		12 mg/m ²	1Vあたり5mlの注射用水で溶解
注射用水	100ml	1 本	
生食	50ml	1 本	
	▶側管②	点滴	

次ページあり

3) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

▶側管③

フラッシュ

4) キロサイド			100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day4~7

1) デキサート	6.6mg		1 V	
生食	50ml		1 本	
	▶側管①	点滴	15 分	

2) キロサイド			100 mg/m ²	
ブドウ糖液5%	500ml		1 袋	
	主管①	点滴	24時間	前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉

day8

1) 生食	50ml		1 本	
-------	------	--	-----	--

フラッシュ
〈所要時間 ー〉