

レジメンcode:	C91-05
適応がん種:	白血病
レジメン名:	MEC療法
間隔:	

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
MIT	ノバントロン	8	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d1~3
VP-16	エトポシド(ベプシト)	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d1~5
Ara-C	キロサイド	100	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~7

day1

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) ノバントロン		8 mg/m <sup>2</sup>	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30分
3) エトポシド(ベプシト)		100 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	3時間
4) キロサイド		100 mg/m <sup>2</sup>	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	24時間

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day2、3

---

1) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	▶側管①	点滴 15 分
<hr/>		
2) ノバントロン		8 mg/m <sup>2</sup>
生食	100ml	1 本
	▶側管②	点滴 30分
<hr/>		
3) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m <sup>2</sup>
生食	500ml	1 袋
	▶側管③	点滴 3時間
<hr/>		
4) キロサイド		100 mg/m <sup>2</sup>
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋
	主管①	点滴 24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 —〉

day4、5

---

1) グラニセトロン	3mg	1 A
デキサート	6.6mg	1 V
生食	50ml	1 本
	▶側管①	点滴 15 分
<hr/>		
2) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m <sup>2</sup>
生食	500ml	1 袋
	▶側管②	点滴 3時間
<hr/>		
3) キロサイド		100 mg/m <sup>2</sup>
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋
	主管①	点滴 24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 —〉

次ページあり

day6、7

---

1) デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分
<hr/>			
2) キロサイド		100 mg/m <sup>2</sup>	
ブドウ糖液5%	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて

〈所要時間 ー〉