

レジメンcode:	C16-25
適応がん種:	胃癌
レジメン名:	3wDOC+S-1
間隔:	①コース S-1単剤 3週間 ②～⑦コース S-1+3wDOC 3週間 ⑧コース～ S-1単剤 6週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
S-1	エスワン	[*1]	mg	内服(朝夕食後)	[*2]
DOC	ドセタキセル(タキソテル)	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1[*2]

[\*1]: 下表を参考

[\*2]: S-1は①～⑦コース目までは14日間連続投与7日間休薬とし、⑧コース目以降は28日間連続投与14日間休薬する。ドセタキセルは②コース目より投与開始し、⑦コース目まで継続する。

①コース目 S-1単剤:3週間間隔

day1～14

- 1) エスワン [ \*1 ] mg  
内服 朝夕食後

[\*1表]

体表面積	投与量
1.25m <sup>2</sup> 未満	40mg/回 【80mg/日】
1.25～1.5m <sup>2</sup> 未満	50mg/回 【100mg/日】
1.5m <sup>2</sup> 以上	60mg/回 【120mg/日】

②～⑦コース目 S-1+3wDOC:3週間間隔

day1

- 1) グラニセトロン 3mg 1 A  
デキサート 6.6mg 1 V  
生食 50ml 1 本  
主管① 点滴 15 分
- 2) ドセタキセル(タキソテル) 40 mg/m<sup>2</sup>  
ブドウ糖液5% 250ml 1 袋  
主管② 点滴 1時間
- 3) 生食 50ml 1 本

<所要時間 約1時間30分>

次ページあり

day1~14

---

- 1) エスワン [\*1] mg  
内服 朝夕食後
- 

[\*1表]: 参照

⑧コース目～ S-1単剤:6週間間隔 [\*3]

day1~28

---

- 1) エスワン [\*1] mg  
内服 朝夕食後
- 

[\*1表]: 参照

[\*3]⑧コース以降の注意点: 前コースの4週投与にてday15以降に発現した有害事象などにより主治医がS-1の4週投与2週休薬による投与継続が困難と判断した場合、S-1の投与方法を2週投与1週休薬に変更することができる。

#### その他

\*適格基準: Stage IIIA、IIIB、IIIC

\*開始: 手術後6週間以内(手術日を0日として手術後42日以内)。

\*終了: 手術後1年間(手術後1年間経過した後は新たなコースに入らない)。