

レジメンcode:	C99-06	備考
適応:	クローン病、潰瘍性大腸炎、強直性脊椎炎、ベーチェット病、難治性網膜ブドウ膜炎	
レジメン名:	レミケード(関節リウマチ、乾癬以外)	
間隔:		

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	レミケード	5	mg/kg	点滴[*1]	0.2.6週(以降8週毎)

0、2、6週(以降8週毎)

- | | | | |
|----------|-------|---------|-------------------------|
| 1) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | ルート確保 |
| 2) レミケード | | 5 mg/kg | [*2] |
| 生食 | 250ml | 1 本 | 1.2ミクロン以下のメンブランフィルターを使用 |
| | 主管② | 点滴 | [*1] |
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |

〈所要時間 ー〉

[*1] 1～3回目までの点滴速度(約2時間で点滴を終了させる場合)

経過時間	点滴速度
0分	20ml/時間×15分
15分	40ml/時間×15分
30分	60ml/時間×15分
45分	80ml/時間×15分
60分	150ml/時間×30分
90分	250ml/時間×30分
120分	点滴終了

↓ Infusion Reactionが認められなければ

4回目以降の点滴速度(約1時間で点滴を終了させる場合)

経過時間	点滴速度
0～15分	100ml/時
15～60分	250ml/時

[*2]6週投与以後、効果不十分・効果減弱した場合、投与量の増量(10mg/kg)が可能

- ・クローン病、ベーチェット病のみ
- ・ただし、増量後(10mg/kg)以降は、2時間かけて投与すること
- ・平均点滴速度は1時間当たり5mg/kgを投与する速度を超えないこと(臨床試験において投与経験がない)

増量後(10mg/kg)の点滴速度(約2時間で点滴を終了させる場合)

経過時間	点滴速度
0～15分	50ml/時
15～120分	125ml/時