

レジメンcode:	C99-09	備考
適応がん種:	間質性肺炎	
レジメン名:	CPAパルス	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	500	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1

day1

- 
- |         |        |     |                |
|---------|--------|-----|----------------|
| 1) アロキシ | 0.75mg | 1 V |                |
| 生食      | 50ml   | 1 本 |                |
|         | 主管①    | 点滴  | 15 分 【ケモセーフ使用】 |
- 
- |           |       |                       |  |
|-----------|-------|-----------------------|--|
| 2) エンドキサン |       | 500 mg/m <sup>2</sup> |  |
| 生食        | 500ml | 1 袋                   | 500mg/m <sup>2</sup> より開始<br>750mg/m <sup>2</sup> まで増量可能 |
|           | 主管②   | 点滴                    | 2時間  |
- 
- |       |      |     |  |
|-------|------|-----|--|
| 3) 生食 | 50ml | 1 本 |  |
|-------|------|-----|--|

フラッシュ

<所要時間 約3時間>

\*出血性膀胱炎の予防として十分量の輸液を投与し、尿量確保を考慮する。

\*輸液制限がある場合にはメスナを考慮する。