

|           |               |
|-----------|---------------|
| レジメンcode: | C99-11        |
| 適応がん種:    | 治療抵抗性のリウマチ性疾患 |
| レジメン名:    | CPAパルス        |
| 間隔:       | 4週間           |

|    |
|----|
| 備考 |
|    |

| 略名  | 抗がん剤(採用薬品名) | 投与量      | 単位                | 投与法     | 投与日 |
|-----|-------------|----------|-------------------|---------|-----|
| CPA | エンドキサン      | 500~1000 | mg/m <sup>2</sup> | 点滴(2時間) | d1  |

day1

|           |        |          |                   |           |
|-----------|--------|----------|-------------------|-----------|
| 1) アロキシ   | 0.75mg | 1 V      |                   |           |
| 生食        | 50ml   | 1 本      |                   |           |
|           | 主管①    | 点滴       | 15 分              | 【ケモセーフ使用】 |
| 2) エンドキサン |        | 500~1000 | mg/m <sup>2</sup> |           |
| 生食        | 500ml  | 1 袋      |                   |           |
|           | 主管②    | 点滴       | 2時間               |           |
| 3) 生食     | 50ml   | 1 本      |                   |           |
|           |        |          |                   | フラッシュ     |

〈所要時間 約3時間〉

\*出血性膀胱炎の予防として十分量の輸液を投与し、尿量確保を考慮する。

\*輸液制限がある場合にはメスナを考慮する。