

レジメンcode:	C18-32
適応がん種:	大腸癌
レジメン名:	5-FU/LV(RPMI療法)
間隔:	8週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
I-LV	レボホリナート	250	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1.8.15.22.29.36
5-FU	フルオロウラシル(5-FU)	600	mg/m <sup>2</sup>	点滴(500ml/h)	d1.8.15.22.29.36

day1.8.15.22.29.36

- 
- 1) 生食 20ml 1 A  
ポート確認、ルート確保用
- 
- 2) レボホリナート 250 mg/m<sup>2</sup>  
 ソルデム3A(ソリタT3) 500ml 1本  
 主管① 点滴 2時間
- 
- 3) デキサート 6.6mg 1 V  
 生食 50ml 1本  
 ▶側管① 点滴 30分 主管①開始30分後から
- 
- 4) フルオロウラシル(5-FU) 600 mg/m<sup>2</sup>  
 生食 50ml 1本 全量25mlに調製  
 ▶側管② 点滴 500ml/h 側管①に続いて
- 
- 5) ヘパリンNaロック 10ml 1筒  
ルートロック

〈所要時間 約2時間30分〉