

レジメンcode:	C85-01	備考
適応がん種:	ホジキンリンパ腫	
レジメン名:	ABVD	
間隔:	4週間	

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	25	mg/m ²	点滴(全開)	d1、15
BLM	ブレオ	10[*1]	mg/m ²	点滴(30分)	d1、15
VLB	エクザール	6[*2]	mg/m ²	点滴(30分)	d1、15
DTIC	ダカルバジン	375	mg/m ²	点滴(30分)[*3]	d1、15

★ADM 総投与量 500mg/m²以下 ★BLM 総投与量 300mg/body以下
縦隔照射を予定している場合、BLM120mgまで

day1、15

- | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg | 1 A | 抗がん剤の投与1時間～1時間30分前に
アプレピタント(イメド [®])125mg内服 |
| デキサート | 3.3mg | 1 A | |
| デキサート | 6.6mg | 1 V | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 |
| 2) ドキシソルビシン(アドリアシン) | | 25 mg/m ² | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 全開 |
| 3) ブレオ | | 10 mg/m ² | 最大15mg[*1] |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 30分 |
| 4) エクザール | | 6 mg/m ² | 最大10mg[*2] |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 30分 |
| 5) ダカルバジン | | 375 mg/m ² | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管⑤ | 点滴 | 30分 点滴経路全体を遮光[*3] |
| 6) 生食 | 50ml | 1 本 | |

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day2,3

アプレピタント(イメド [®])	80 mg
	内服 朝食後