

レジメンcode:	C85-02
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	CHOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d1
VCR	オンコビン	1.4[*]	mg/m ²	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

- | | | | |
|---------------------|-------|-----------------------|----------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15 分 【ケモセーフ使用】 |
| 2) エンドキサン | | 750 mg/m ² | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管② | 点滴 | 1時間 |
| 3) ドキシソルビシン(アドリアシン) | | 50 mg/m ² | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管③ | 点滴 | 全開 |
| 4) オンコビン | | 1.4 mg/m ² | 最大2mg[*] |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管④ | 点滴 | 全開 |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 | |

フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day1~5

- | | | | |
|------------|----|-------------|------|
| 1) プレドニゾロン | | 100 mg/body | |
| | 内服 | | 朝昼食後 |