

レジメンcode:	C85-03
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-CHOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	50	mg/m ²	点滴(全開)	d2
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m ²	点滴(全開)	d2
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d2~6

★ADM 総投与量 500mg/m²以下

day1

1) カロナール	200mg	2 錠	
d-クロルフェニラミン		1 錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) 生食	50ml	1 本	内服前投薬、心電図確認 ルート確保
2) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
主管①	点滴		初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
3) 生食	50ml	1 本	フラッシュ
4) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	ルートロック

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg		1 A	
生食	50ml		1 本	
	主管①	点滴	15 分	【ケモセーフ使用】
<hr/>				
2) エンドキサン			750 mg/m ²	
生食	250ml		1 袋	
	主管②	点滴	1時間	
<hr/>				
3) ドキソルビシン(アドリアシン)			50 mg/m ²	
生食	50ml		1 本	
	主管③	点滴	全開	
<hr/>				
4) オンコピン			1.4 mg/m ²	最大2mg[*2]
生食	50ml		1 本	
	主管④	点滴	全開	
<hr/>				
5) 生食	50ml		1 本	
				フラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day2~6

1) プレドニゾロン			100 mg/body	
	内服		朝昼食後	
