

レジメンcode:	C85-04
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	CHASE
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	デキサート	33	mg/body	点滴(30分)	d1~3
CPA	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴(1時間)	d1
VP-16	エトポシド(ベプシド)	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d1~3
Ara-C	キロサイド[*1]	2000	mg/m ²	点滴(3時間)	d2、3

[*1]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日6回

Ara-C終了3日目~9日目(7日間)

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日4回

day1

- | | | | |
|----------------|-------|------------------------|---------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg | 1 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | 主管① | 点滴 | 15分 【ケモセーフ使用】 |
| 2) デキサート | 6.6mg | 5 V | |
| 生食 | 100ml | 1 本 | |
| | 主管② | 点滴 | 30分 |
| 3) エンドキサン | | 1200 mg/m ² | |
| 生食 | 250ml | 1 袋 | |
| | 主管③ | 点滴 | 1時間 |
| 4) エトポシド(ベプシド) | | 100 mg/m ² | |
| 生食 | 500ml | 1 袋 | |
| | 主管④ | 点滴 | 2時間 |
| 5) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 6) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |

次ページあり

〈所要時間 約4時間30分〉

day2、3

1) グラニセトロン	3mg	1 A
生食	50ml	1 本
主管①	点滴	15 分
2) デキサート	6.6mg	5 V
生食	100ml	1 本
主管②	点滴	30 分
3) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²
生食	500ml	1 袋
主管③	点滴	2時間
4) キロサイド		2000 mg/m ²
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製
主管④	点滴	3時間
5) 生食	50ml	1 本
		フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒
		ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉