

レジメンcode:	C85-05
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-CHASE
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*]	d1
	デキサート	33	mg/body	点滴(30分)	d2~4
CPA	エンドキサン	1200	mg/m ²	点滴(1時間)	d2
VP-16	エトポシド(ベプシド)	100	mg/m ²	点滴(2時間)	d2~4
Ara-C	キロサイド[*1]	2000	mg/m ²	点滴(3時間)	d3、4

day1

- | | | | |
|-------------|-------|----|--------------|
| 1) カロナール | 200mg | 2錠 | |
| d-クロルフェニラミン | | 1錠 | |
| | 内服 | | リツキシマブ投与30分前 |

[*1]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

- | | | | |
|------------------|----|------|--|
| 1) 点眼・点鼻用リンデロンA液 | | | |
| | 点眼 | 1日6回 | |

Ara-C終了3日目~9日目(7日間)

- | | | | |
|------------------|----|------|--|
| 1) 点眼・点鼻用リンデロンA液 | | | |
| | 点眼 | 1日4回 | |

day1

- | | | | |
|------------------|-------|-----------------------|--|
| 1) 生食 | 50ml | 1本 | 内服前投薬、心電図確認
ルート確保 |
| 2) リツキシマブ(リツキサン) | | 375 mg/m ² | |
| 生食 | 500ml | | 生食で10倍に希釈 |
| | 主管① | 点滴 | 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr
と1時間ごとに投与速度を上げる
2回目以降は100ml/hrから開始[*] |
| 3) 生食 | 50ml | 1本 | フラッシュ |
| 4) ヘパリンNaロック | 10ml | 1筒 | ルートロック |

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) エンドキサン		1200 mg/m ²	
生食	250ml	1 袋	
	主管③	点滴	1時間
4) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	2時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約4時間30分〉

day3、4

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分
2) デキサート	6.6mg	5 V	
生食	100ml	1 本	
	主管②	点滴	30 分
3) エトポシド(ベプシド)		100 mg/m ²	
生食	500ml	1 袋	
	主管③	点滴	2時間
4) キロサイド		2000 mg/m ²	
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製	
	主管④	点滴	3時間
5) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ
6) ヘパリンNaロック	10ml	1 筒	
			ルートロック

〈所要時間 約6時間30分〉