

レジメンcode:	C85-06
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	ESHAP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
mPSL	ソル・メルコート	500	mg/body	点滴(30分)	d1~5
VP-16	エトポシド(ベプシド)	40	mg/m <sup>2</sup>	点滴(2時間)	d1~4
CDDP	シスプラチン(プリプラチン)	25	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~4
Ara-C	キロサイド[*1]	2000	mg/m <sup>2</sup>	点滴(3時間)	d5

★尿量確保に注意し、必要に応じてマンニトール及びフロセミド等の利尿剤を投与する。

[\*1]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日6回

Ara-C終了3日目~9日目(7日間)

1) 点眼・点鼻用リンデロンA液

点眼 1日4回

day1

1) 硫酸Mg補正液

1 A

生食

500ml

1 袋

主管①

点滴

2時間

2) 生食

500ml

1 袋

主管②

点滴

2時間

3) グラニセトロン

3mg

1 A

生食

50ml

1 本

▶側管①

点滴

15 分

主管②開始60分後から

4) ソル・メルコート

500mg

1 V

生食

100ml

1 本

▶側管②

点滴

30 分

側管①に続いて

5) エトポシド(ベプシド)

40 mg/m<sup>2</sup>

生食

500ml

1 袋

主管③

点滴

2時間

次ページあり

6) シスプラチン(フリプラチン)		25 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	主管④	点滴	24時間
7) 生食	500ml	1 袋	
	▶側管③	点滴	2時間 主管④と同時に
8) 生食	500ml	1 袋	
	▶側管④	点滴	2時間 側管③に続いて

〈所要時間 ー〉

day2~4

1) 硫酸Mg補正液		1 A	
生食	500ml	1 袋	
	▶側管①	点滴	2時間
2) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管②	点滴	15 分 側管①に続いて
3) ソル・メルコート	500mg	1 V	
生食	100ml	1 本	
	▶側管③	点滴	30 分 側管②に続いて
4) エトポシド(ペプシド)		40 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	▶側管④	点滴	2時間 側管③に続いて
5) シスプラチン(フリプラチン)		25 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて
6) 生食	500ml	1 袋	
	▶側管⑤	点滴	2時間 主管①と同時に
7) 生食	500ml	1 袋	
	▶側管⑥	点滴	2時間 側管⑤に続いて

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day5

1) グラニセトロン	3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	主管①	点滴	15 分	前日の主管に続いて
2) ソル・メルコート	500mg	1 V		
生食	100ml	1 本		
	主管②	点滴	30 分	
3) キロサイド		2000 mg/m <sup>2</sup>		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	主管③	点滴	3時間	
4) 生食	500ml	1 袋		
	主管④	点滴	2時間	

〈所要時間 6時間30分〉