

レジメンcode:	C85-08
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	EPOCH
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
VP-16	エトポシド(ベプシド)	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~4
ADM	ドキシソルビシン(アドリアシン)	10	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~4
VCR	オンコビン	0.4	mg/m <sup>2</sup>	点滴(24時間)	d1~4
CPA	エンドキサン	750	mg/m <sup>2</sup>	点滴(30分)	d5
PSL	プレドニゾロン	60	mg/m <sup>2</sup>	内服	d1~5

★ADM 総投与量 500mg/m<sup>2</sup>以下

day1

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15 分 【ケモセーフ使用】
2) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m <sup>2</sup>	
ドキシソルビシン(アドリアシン)		10 mg/m <sup>2</sup>	
オンコビン		0.4 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	主管②	点滴	24時間

〈所要時間 ー〉

day2~4

1) エトポシド(ベプシド)		50 mg/m <sup>2</sup>	
ドキシソルビシン(アドリアシン)		10 mg/m <sup>2</sup>	
オンコビン		0.4 mg/m <sup>2</sup>	
生食	500ml	1 袋	
	主管①	点滴	24時間 前日の主管に続いて
2) グラニセトロン	3mg	1 A	
生食	50ml	1 本	
	▶側管①	点滴	15 分

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day5

---

1) グラニセトロン	3mg	1 A
生食	50ml	1 本
主管①	点滴	15 分 前日の主管に続いて

---

2) エンドキサン		750 mg/m <sup>2</sup>
生食	100ml	1 本
主管②	点滴	30分

---

3) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

フラッシュ

〈所要時間 1時間30分〉

day1~5

---

1) プレドニゾン		60 mg/m <sup>2</sup>
内服		朝・昼食後

---