

レジメンcode:	C50-18
適応がん種:	乳癌
レジメン名:	HER+LAP
間隔:	1週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
HER	トラスツズマブ(ハーセプチン)(初回)	4	mg/kg	点滴(90分)	
	(2回目以降)	2	mg/kg	点滴(30分)	d1
LAP	タイケルブ	1000	mg/body	内服	連日

day1

- | | | | |
|--------------------|-------|-------|-------------------------------|
| 1) 生食 | 20ml | 1 A | |
| | | | ポート確認 |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | ルート確保 |
| 3) トラスツズマブ(ハーセプチン) | | 初回 | 4mg/kg |
| | | 2回目以降 | 2mg/kg |
| 注射用水 | 100ml | 1 本 | 60mg:3ml、150mg:7.2mlの注射用水で溶解。 |
| 生食 | 100ml | 1 本 | 21mg/mlの溶解液になる。 |
| | 主管① | 点滴 | 30 分 (初回 90分) |
| 4) 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | | | フラッシュ |
| 5) ヘパリンNaロック | 10ml | 1 筒 | |
| | | | ルートロック |
- 〈所要時間 約1時間〉
〈初回 約2時間〉

連日

- | | |
|----------|-----------------------|
| 1) タイケルブ | 1000 mg/body (4錠) |
| | 内服 食事の1時間以上前又は食後1時間以降 |