

レジメンcode:	C85-10
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	THP-GOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
CPA	エンドキサン	750	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d1
THP	テラルビシン	50	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
VCR	オンコビン	1.4[*]	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d1
PSL	プレドニゾン	100	mg/body	内服	d1~5

★THP 総投与量 950mg/m<sup>2</sup>以下

day1

- |            |       |                                |
|------------|-------|--------------------------------|
| 1) グラニセトロン | 3mg   | 1 A                            |
| 生食         | 50ml  | 1 本                            |
|            | 主管①   | 点滴 15 分 <b>【ケモセーフ使用】</b>       |
| 2) エンドキサン  |       | 750 mg/m <sup>2</sup>          |
| 生食         | 250ml | 1 袋                            |
|            | 主管②   | 点滴 1時間                         |
| 3) テラルビシン  |       | 50 mg/m <sup>2</sup>           |
| ブドウ糖液5%    | 50ml  | 1 本                            |
|            | 主管③   | 点滴 全開                          |
| 4) オンコビン   |       | 1.4 mg/m <sup>2</sup> 最大2mg[*] |
| 生食         | 50ml  | 1 本                            |
|            | 主管④   | 点滴 全開                          |
| 5) 生食      | 50ml  | 1 本                            |

ルートフラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day1~5

- |           |    |             |
|-----------|----|-------------|
| 1) プレドニゾン |    | 100 mg/body |
|           | 内服 | 朝昼食後        |