

レジメンcode:	C85-13
適応がん種:	非ホジキンリンパ腫
レジメン名:	R-GOP
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m <sup>2</sup>	点滴[*1]	d1
CPA	エンドキサン	750	mg/m <sup>2</sup>	点滴(1時間)	d2
VCR	オンコビン	1.4[*2]	mg/m <sup>2</sup>	点滴(全開)	d2
PSL	プレドニゾロン	100	mg/body	内服	d2~6

day1

- |             |       |    |              |
|-------------|-------|----|--------------|
| 1) カロナール    | 200mg | 2錠 |              |
| d-クロルフェニラミン |       | 1錠 |              |
|             | 内服    |    | リツキシマブ投与30分前 |

day1

- |                  |       |                       |   |
|------------------|-------|-----------------------|---|
| 1) 生食            | 50ml  | 1本                    | 内服前投薬、心電図確認<br>ルート確保  |
| 2) リツキシマブ(リツキサン) |       | 375 mg/m <sup>2</sup> |   |
| 生食               | 500ml |                       | 生食で10倍に希釈   |
| 主管①              | 点滴    |                       | 初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr<br>と1時間ごとに投与速度を上げる<br>2回目以降は100ml/hrから開始[*1] |
| 3) 生食            | 50ml  | 1本                    | フラッシュ   |
| 4) ヘパリンNaロック     | 10ml  | 1筒                    | ルートロック  |

〈所要時間 約6時間〉

次ページあり

day2

---

1) グラニセトロン	3mg	1 A
生食	50ml	1 本
	主管①	点滴 15 分 【ケモセーフ使用】

---

2) エンドキサン		750 mg/m <sup>2</sup>
生食	250ml	1 袋
	主管②	点滴 1時間

---

3) オンコビン		1.4 mg/m <sup>2</sup> 最大2mg[*2]
生食	50ml	1 本
	主管③	点滴 全開

---

4) 生食	50ml	1 本
-------	------	-----

---

ルートフラッシュ

〈所要時間 約2時間30分〉

day2~6

---

1) プレドニゾロン		100 mg/body
	内服	朝昼食後

---