

レジメンcode:	C85-17
適応がん種:	悪性リンパ腫
レジメン名:	Bendamustine-R
間隔:	4週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
	トリアキシン	90	mg/m ²	点滴	d1、2
	リツキシマブ(リツキサン)	375	mg/m ²	点滴[*1]	d1

day1

1) カロナール	200mg	2錠	
d-クロルフェニラミン		1錠	
	内服		リツキシマブ投与30分前

day1

1) グラニセトロン	3mg	1A	
デキサート	3.3mg	1A	
デキサート	6.6mg	1V	
生食	50ml	1本	内服前投薬、心電図確認
	主管①	点滴	15分 【ケモセーフ使用】
2) トリアキシン		90 mg/m ²	
大塚蒸留水	100ml	1本	1Vあたり40mLの蒸留水
生食	250ml	1袋	で溶解。全量250mL
	主管②	点滴	1時間 調製後、3時間以内に投与を終了すること
3) リツキシマブ(リツキサン)		375 mg/m ²	
生食	500ml		生食で10倍に希釈
	主管③	点滴	初回は25ml/hr→100ml/hr→200ml/hr と1時間ごとに投与速度を上げる 2回目以降は100ml/hrから開始[*1]
4) 生食	50ml	1本	フラッシュ
5) ヘパリンNaロック	10ml	1筒	ルートロック

〈所要時間 約7時間〉

次ページあり

day2

1) グラニセトロン	3mg	1 A	
デキサート	3.3mg	1 A	
デキサート	6.6mg	1 V	
生食	50ml	1 本	
	主管①	点滴	15分 【ケモセーフ使用】
2) トレアキシシ		90 mg/m ²	
大塚蒸留水	100ml	1 本	1Vあたり40mLの蒸留水
生食	250ml	1 袋	で溶解。全量250mL
	主管②	点滴	1時間 調製後、3時間以内に投与を終了すること
3) 生食	50ml	1 本	
			フラッシュ

〈所要時間 約2時間〉