

レジメンcode:	C85-19
適応がん種:	悪性リンパ腫(中枢神経系リンパ腫)
レジメン名:	High-dose MTX+AraC療法
間隔:	3週間

備考

略名	抗がん剤(採用薬品名)	投与量	単位	投与法	投与日
MTX	メソトレキセート[*1]	500	mg/m ²	点滴(15分)	d1
		3000	mg/m ²	点滴(3時間)	d1
Ara-C	キロサイド[*2]	2000	mg/m ²	点滴(3時間)*12時間毎	d2、3

[*1]

day0~4

- 1) ダイアモックス 250~500 mg/日
内服 朝夕食後

*尿を経時的にチェックしpH7.0以上に維持すること。

*ダイアモックスは利尿及び尿のアルカリ化作用を有するので、ダイアモックス250~500mg/日をメソトレキセート投与前日からロイコボリンの救援投与終了まで経口又は静脈内投与すること。

*尿を酸性化する利尿剤(例えば、フロセミド、チアジド系利尿剤等)の使用を避けること

*メソトレキセートの血中濃度を経時的に測定すること。

メソトレキセートの血中濃度の危険限界は24時間値で 1×10^{-5} モル濃度、48時間値で 1×10^{-6} モル濃度、72時間値で 1×10^{-7} モル濃度であるので危険限界以上の濃度の際はロイコボリンの増量投与・ロイコボリン救援投与の延長等の処置を行うこと。

[*2]

Ara-C投与前日から投与終了後2日間

- 1) 点眼・点鼻用リンデロンA液
点眼 1日6回

Ara-C終了3日目~9日目(7日間)

- 1) 点眼・点鼻用リンデロンA液
点眼 1日4回

day0

- 1) ソルデム3A 500ml 1本
メイロン 20ml 1A
主管 点滴 8時間 (18:00)

<所要時間 - >

次ページあり

day1

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
3) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15分	(10:45)
4) メソトレキセート		500 mg/m ²		
生食	50ml	全量50mlになるように生食を調製		
	▶側管②	点滴	15分	(11:00)
5) メソトレキセート		3000 mg/m ²		
生食	500ml	全量500mlになるように生食を調製		
	▶側管③	点滴	3時間	(11:15)
6) 生食	50ml	1 本		
	▶側管④			フラッシュ
7) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day2

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
3) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管①	点滴	15分	(10:45)
4) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15分	(11:00)
5) キロサイド		2000 mg/m ²		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	▶側管③	点滴	3時間	(11:15)
6) 生食	50ml	1 本	フラッシュ	
	▶側管④			(14:15)
7) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管⑤	点滴	15分	(17:00)
8) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)
9) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管⑥	点滴	15分	(23:00)
10) キロサイド		2000 mg/m ²		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	▶側管⑦	点滴	3時間	(23:15)

〈所要時間 ー〉

次ページあり

day3

1) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管①	点滴	8時間	(2:00)
2) 生食	50ml	1 本		前日のキロサイド投与後フラッシュ
	▶側管①			(2:15)
3) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管②	点滴	15分	(5:00)
4) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管②	点滴	8時間	(10:00)
5) グラニセトロン	3mg	1 A		
デキサート	6.6mg	1 V		
デキサート	3.3mg	1 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管③	点滴	15分	(10:45)
6) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管④	点滴	15分	(11:00)
7) キロサイド		2000 mg/m ²		
生食	500ml	総液量650ml以下になるように生食を調製		
	▶側管⑤	点滴	3時間	(11:15)
8) 生食	50ml	1 本		フラッシュ
	▶側管⑥			(14:15)
9) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管⑦	点滴	15分	(17:00)
10) ソルデム3A	500ml	1 本		
メイロン	20ml	1 A		
	主管③	点滴	8時間	(18:00)
11) ロイコボリン	3mg	5 A		
生食	50ml	1 本		
	▶側管⑧	点滴	15分	(23:00)

次ページあり

12) キロサイド 2000 mg/m²

生食

500ml 総液量650ml以下になるように生食を調製

▶側管⑨ 点滴 3時間 (23:15)

〈所要時間 ー〉

day4

-
- | | | | |
|-----------|-------|-----|------------------|
| 1) ソルデム3A | 500ml | 1 本 | |
| メイロン | 20ml | 1 A | |
| | 主管① | 点滴 | 8時間 (2:00) |
| 2) 生食 | 50ml | 1 本 | 前日のキロサイド投与後フラッシュ |
| | ▶側管① | | (2:15) |
| 3) ロイコボリン | 3mg | 5 A | |
| 生食 | 50ml | 1 本 | |
| | ▶側管② | 点滴 | 15分 (5:00) |
-

〈所要時間 ー〉